

玉機微義卷之四十九

婦門

○論經閉不行

內經陰陽別論云。二陽之病發心脾。有不得隱曲。子不月。其傳爲風消。爲息。竟者死不治。東垣曰。婦人脾胃久虛。或形羸。氣血俱衰。而致經水斷絕不行。或病中消胃熱。善食漸瘦。津液不生。夫經者。血脈津液所化。津液既絕。爲熱所燻。肌肉消瘦。時見渴燥。血海枯竭。病名曰血枯。經絕宜瀉胃之燥熱。補益氣血。經自行矣。此證或經適行而有子。子不安爲胎病者有矣。或心包脈洪數。煥一見大便秘澀。小便雖清。不

利而經水閉絕不行。此乃血海乾枯。宜調血脈。除包絡中火邪。而經自行矣。內經所謂小腸移熱於大腸。爲痔瘻。爲沉。月澁不利。則月事沉滯而不利。故云爲痔瘻。爲沉也。或因勞心。心火上行。月事不來。安心補血。瀉火。經自行矣。故內經云。月事不來者。胞脈閉也。胞脈者。屬心而絡於胞中。令氣上迫肺心。氣不得下。故月事不來也。曾治驗裴澤之夫人。病寒熱而月事不至者數年矣。已加喘嗽。醫者率以蛤蚧桂附等投之。曰不然。夫人病陰爲陽所搏。溫劑太過。故無益而反害。投以涼血和血之藥。則經行矣。已而果然。  
要略曰。婦人之病因虛積冷結氣。爲證。經水斷絕。至

經水不調或紫或黑  
丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火色也血爲氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁上應於月其行有常名之曰經爲氣之配因氣而行或遲或速者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛者血俱虛也色淡者亦虛也而有水混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但見其紫者黑者作痛者成塊者率指爲風冷乘之而行溫熱之劑禍不旋踵矣良由病源論月水之病皆

生等說

○論經水不調或紫或黑

丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火色也血爲氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁上應於月其行有常名之曰經爲氣之配因氣而行或遲或速者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛者血俱虛也色淡者亦虛也而有水混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但見其紫者黑者作痛者成塊者率指爲風冷乘之而行溫熱之劑禍不旋踵矣良由病源論月水之病皆

風冷乘之。宜其相習而成俗也。或曰黑者北方水之色也。紫者黑之漸也。非冷而何。予曰經云。亢則害。承乃制。熱甚者必兼水化。所以熱則紫甚則黑也。况於人性執而鄙嗜欲加倍。臟腑厥陽之火。無日不起。非熱而何。若曰風冷必須外得。設或有之。吾恐千百不一也。

按此論經病甚詳。大抵不得率指為風冷所乘者。此由良方所言。世俗往往因之。慎人故戒慎之也。然冷證外邪初感入經。必痛或不痛者。久則鬱而變熱矣。且寒則凝。既行而紫黑。故非寒也。

○論經漏不止

內經陰陽別論云。陰虛陽搏謂之崩。東垣曰。婦人脾胃虛損。致命門脈沉細而數疾。或沉弦而洪。大有力寸關脈亦然。皆由脾胃有虧。下陷於腎。與相火相合。濕熱下迫。經漏不止。其色紫黑。如夏月腐肉之臭。中有白帶者。脈必弦細。寒作於中。中有赤帶者。其脈洪。疾熱明矣。必腰痛或臍下痛。臨經欲行。先見寒熱。往來兩脇急縮。兼脾胃證出見。或四肢困熱。心煩不待眠卧。心下惡宜大補脾胃。而升舉血氣。可一服而愈。或人故貴脫勢。人事踈少。或先富後貧。心氣不足。其火大熾。旺於血脈之中。又致脾胃飲食失節。火乘其中。形質肌肉容顏似不病者。此心病者。不行於診。



故脾胃飲食不運其證顯然。然則經水不調而下。其  
來適斷。暴下不止。皆由經水不調而下。其  
而心不動以大補氣血之藥。養脾胃微加鎮  
火之藥。治其心。補陰瀉陽。經自止矣。痿論云。悲哀  
甚則胞絡絕。胞絡絕則陽氣內動。發則心下崩。數溲  
血也。故本病曰大經空虛。發則肌痺。傳為脉痿。此之  
謂也。

良方論曰。婦人崩中。由臟腑傷損。衝任血氣俱虛。故  
也。衝任為經脉之海。血氣之行外循經絡。內榮臟腑。  
若無傷損。則陰陽和平。而氣血調適。若勞動過多。致  
臟腑俱傷。而衝任之氣虛。不能約制其經血。故忽然

暴下。或由陰陽相搏。為熱所乘。攻傷衝任。血得熱則  
流散。甚者至於昏悶。其脉數疾。小為順。大甚者逆。  
按此備言經脉致病之因。本於臟腑傷損。合前東  
垣所論。極言因熱因虛。或悲哀七情等所致病機。  
殆無餘蘊矣。

○脉法

脉經曰。尺脉滑。血氣實。婦人經脉不利。○少陰脉弱  
而微。微則少血。少陰脉滑而數者。陰中則生瘡。○寸  
口脉浮而弱。浮則為虛弱。則無血。○脉來至狀如琴  
弦。若少腹痛。主月水不利。孔竅生瘡。○肝脉沉。主月  
水不利。腰腹痛。○尺脉來而斷絕者。月水不利。○寸



關調如故而尺脉絕不至者。月水不利。當患小腹引腰痛。氣滯上攻胸臆也。○經不通。繞臍寒疝痛。其脉沉緊。此由寒氣客於血室。血凝不行。結積血爲氣所衝。新血與故血相搏。故痛。○漏血下。赤白脉遲者。脉小虛滑者生。急疾者大緊實數者死。○暴崩下血。寸口脉微遲。尺脉微弦微遲爲寒。在上焦。但吐爾。今尺脉微弦如此。即小腹引腰痛者。必下血也。○寸口弦而大。弦則爲減。大則爲乳。減則爲寒。乳則爲虛。寒虛相搏。脉則爲革。婦人則半產漏下。○尺脉急而弦大。風邪入少陰之經。女子漏自下。赤。○漏下赤白。日下血數斗。脉急疾者死。遲者生。○尺寸脉虛者漏。

血漏血脉浮不可治也

○論赤白帶下

機要云。赤者熱入小腸。白者熱入大腸。其本實熱。窻結于脉不散。故爲赤白帶下也。窻。屈也。結也。屈滯而病熱不散。先以十棗湯下之。後服苦楝丸。大玄胡散調下之。熱去濕除。病自除也。

按此正是論有餘之證也。論見下

良方論云。帶下起於風氣寒熱之所傷。或產後早起不避風邪。風邪之氣入於胞門。或中經脉流轉臍腑而發下血。名爲帶下。若傷足厥陰肝之經。其色青如泥。傷手少陰心之經。其色赤如紅津。傷手太陰肺之

經其色白形如涕。傷足太陰脾之經則其色黃如爛瓜。傷足少陰腎之經則色黑如衄血。此其因也。

按此言風氣寒熱之所傷諸臟致證似言外邪。大抵此證多有本於陰虛陽竭。榮氣不升。經財凝泣。衛氣下陷。精氣累滯於下焦竒經之分。蘊積而成其病。或醉飽房勞。服食燥劑所致也。白物如涕之狀。故言帶者亦病形也。經云帶脉爲病而得者。而白者屬氣。赤屬血。東垣舉脉訣云。崩中日久爲白帶。漏下多時骨木枯。言崩中者始病血崩。久則血少復亡其陽。故白滑之物。下流不止。此可見未得全拘於帶脉矣。詳病亦有濕痰流注於下焦。或腎

肝陰滯之濕勝。或因驚恐。而木乘土位。濁液下流。或思慕爲筋痿。內經所謂二陽之證發心脾是也。或餘經濕熱屈滯於少腹。小腹之下。而病本殊。則皆爲氣血虛損。榮衛之精氣累滯而成。其病標一也。前人立論。殆盡病機。則治法無定。若戴人以帶下。得兩手脉俱滑大而有力量。乃上用宣去痰飲。下以導水丸泄濕熱。繼以淡劑滲之。此爲瀉實也。如其諸脉微細。或沉緊而澁。按之空虛。或洪大而澁。按之無力。正爲元氣不足。陰虛筋痿。虛極中寒等證。東垣有補陽調經固真等例。乃兼責虛也。丹溪先生注因濕痰下注。用海石南星椿根皮之類較

之前人下之而後吐以提其氣或發中兼補補中兼利燥中兼升發潤中益氣溫而兼收澀之例不同蓋病機有輕重淺深之異爾

○論師尼寡婦異乎妻妾之治

寶鑑曰宋褚澄療師尼寡婦別製方蓋有為也此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧久則為勞史記倉公傳載濟北王侍人韓女病腰背痛寒熱衆醫多以爲寒熱倉公曰病得之欲男子不可得也何以知診得其脉肝脉弦出寸口是以知之蓋男子以精爲主婦人以血爲主男子精盛以思室女人血盛以懷胎也如厥陰脉

弦出寸口又上魚際則陰盛可知故知褚氏之言有謂矣

○論胎產諸證

病機機要云治胎產之病從厥陰經論之無犯胃氣及上二焦爲之三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下卑之證利大便則脉數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣如發渴而白虎氣弱則黃芪血刺痛而用當歸腹中痛而加之芍藥大抵產病天行從增損柴胡雜證從增損四物宜詳察脉證而用之



謹按已上云胎產禁例。大抵主於原氣本病爲要。至於病體所因不同。學者又必當處於權變也。且胎前之證。良方悉具。但每證治例殊少。如胎漏。胎痛。子煩。子腫等證。出方皆是治本病之例。設所因不同。或有所兼之證。如胎漏下血。亦有氣虛血熱。腹痛亦有濕熱者。或形志苦樂不一。七情所動。氣動血病。胎氣即損。雖治例未能以盡其變。然欲學者臨證。自推充而行之爾。今於諸證。未能一一悉具。聊以證治數例。附于後云。

○胎自墮論

丹溪曰。陽施陰化。胎孕乃成。血氣虛乏。不足榮養。其

胎則墮。譬如枝枯則果落。藤痿則花墜。又有勞恐傷情。內火便動。亦能墮胎。譬如風撼其木。人折其枝也。火能消物。造化自然。病源乃謂風冷傷於子臟而墮。此未得病情者也。予見賈氏婦。但有孕至三箇月。左右必墮。診其脉。左手大而無力。重則瀦。知其血少也。以其壯年。只補中氣。使血自榮。時正初夏。教以濃煎白朮湯。下黃芩末一錢。與數十貼。得保全而生。因而思之。墮於內熱而虛者。於理爲多。曰熱曰虛。蓋孕至三月。正屬相火。所以易墮。不然何以黃芩熟艾阿膠等。爲安胎妙藥耶。

○難產論

丹溪曰。世之難產者。往往見於鬱悶安佚之人。富貴奉養之家。若貧賤者。鮮有之。古方止有瘦胎飲一論。而其方爲湖陽公所作也。恐非至到之言。蓋用之者。其難自若。予族妹苦於難產。遇胎則觸而去之。予甚憫焉。視其形肥而勤於女工。知其氣虛。久坐氣不運。而愈若。見在胞胎。因母氣虛。不能自運耳。當補其母之氣。則兒徒易產。今其有孕。至五六月來。告遂於大。全良方紫蘇飲。加補氣藥。與之數十貼。因得男。甚快。因以此方。隨母之性稟。與時令加減。服者無不應。用。臨產時。腹不覺痛。產母亦無病。因名方曰達生散云。

○論局方胎產用藥之誤

丹溪曰。或問婦人一門。無非經候胎產用藥。溫熱於理。頗通。吾子其妄言乎。予曰。婦人以血爲主。血屬陰。易於虧欠。非善於調攝者。不能保全也。餘方是否。若神仙聚寶丹。則有不能忘言者。其方治血海虛寒。虛熱盜汗。理宜補養。琥珀之燥。麝香之散。可以用乎。面色痿黃。肢體浮腫。理宜導濕。乳香沒藥。自可治血。可以用乎。胎前產後。虛實不同。逐敗養新。其補難並。積塊堅凝。赤白崩漏。宜於彼者。必好於此。而參以一方。通流乎。世人以其品貴名雅。又喜其奇。所以安神去邪。令人有子。殊不知積溫成毒。其毒無不。無不被補。自非五臟能言。醫者終不知。其毒生他。

證。陽虛之火。易成內傷之病。先哲具有訓戒。以滋補之藥。而又不常服。當歸丸。當歸建中湯。四順理中丸。雖是滋補。悉犯桂附乾姜。僭熱之劑。臟腑無寒。何處消受。若夫兒之初生。母腹頓寬。便啖雞子。且與火鹽。不思雞子難化。火鹽發熱。展轉爲病。醫者不識。委指他病。率爾用藥。寧不誤人。予每見產婦之無疾者。必教以却去黑神散。與夫雞子火鹽。諸般肉食。且與白粥。將理間。以些小石首。鱖魚。令甘淡食之。至半月以後。與少肉。雖雞子亦須豁開煮之。大能養胃。却痰。彼當富貴之家。驕恣之婦。率有白帶。頭風氣痛。膈滿痰逆。口乾經事不調。髮脫體熱。皆是

陽勝陰虛之病。天生血氣本自和平。日勝日虛。又焉知此等繆妄。有以啓之耶。

○論婦人服熱劑求子之誤

丹溪曰。無子之因。多起於父氣之不足。豈可獨歸罪於母血之虛寒。况母之血病。奚止虛與寒而已哉。然古方治婦人無子。惟秦桂丸一方。其性熱。其辭確。今之欲得子者。率皆服之。無疑。夫求子於陰血。何至輕用熱劑耶。或曰。春氣溫和。則物生。冬氣寒凜。則物消。不假熱劑。何由子。臟得暖而成胎。予曰。詩言婦人和平。則樂有子。和則氣血不爭。平則陰陽不乖。今得此丸。經血必轉紫黑。漸成衰少。或先或後。始則飲食驟



進久則口苦舌乾。陰陽不平。血氣不和。不能成胎。縱使有成子亦多病。以其能損真陰也。鄭憲史子生七箇月得淋。淋云見淋門

謹按婦人無子。多因經血不調。或陰虛血少。積聚痰氣。嗜慾等致。種種不同。矣。已。與寒而已。然經寒者亦有之。但不可例為常法。爾。是以先生論此。戒後人不得病機之的者。斯藥勿妄行也。况無子之因。亦豈止於婦室者。如東垣云。李和叔問。中年以來得一子。至一歲之後。身生紅絲瘤。不救。後三四子。至一二歲。皆病瘤而死。何緣至此疾。翌日。曰。之謂曰。汝乃腎中伏火。精氣中多有紅絲。以氣相

傳生子。故有此疾。俗名胎瘤是也。汝試視之。果如其言。遂以滋腎丸數服。以瀉腎中火邪。補真陰不足。忌酒辛熱之物。其妻與六味地黃丸。以養陰血。受胎五月之後。以黃芩白朮二味作散。啖五七服。後生子。至三歲前。證不復作。今已年壯。噫。合觀先生已上所論。則其旨深矣。

婦人治法

○調經之劑

芎方四物湯。治衝任虛損。月水不調。臍腹疝痛。

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃各等分

右咬咀。每半兩水煎服。

按此手足太陰厥陰藥也

逍遙散治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱

甘草炙半兩 當歸 茯苓 白芍藥

白朮 柴胡各一兩

右咬咀每半兩入姜薄荷葉煎服

按此足三陽三陰藥也散血中濕熱之劑

膠艾湯治勞傷血氣衝上崩漏帶下血多淋瀝不斷

阿膠熬 川芎 艾葉各二兩 當歸

艾葉炒各三兩 熟地黄 白芍藥各四兩

右咬咀每半兩水煎

按此溫經補血之藥也厥陰例

良方溫經湯治婦人血虛虛寒月水不利

當歸 川芎 赤芍藥 桂心

牡丹皮 莪朮各 人參 甘草

牛膝各一兩

右咬咀每五錢水煎服

薑黃散治血臟久冷月水不調臍腹脹痛

當歸 牡丹皮 延胡各 赤芍藥

川芎 紅花 生心 莪朮

川薑黃各

右為末每一錢水煎服酒同煎亦可

按此一方通經之劑破血之藥非止於溫經也臍

冷氣血滯者可用。姑存之。  
加減四物湯

經候微少，漸漸不通，手足煩疼，漸瘦，生潮熱，脈微數。本方去地黃、川芎，加澤蘭葉三倍，甘草半分。經候過多，本方去熟地黃，加生地黃。

經行身熱，脈數頭昏。本方加柴胡、黃芩，各半兩。經行微少，或脹或疼，四肢疼痛，加延胡、沒藥、白芷。與本方等，淡醋湯調下。末子。

經候不調，心腹疝痛，只用芎歸二味，名君臣散。鹿茸丸，治衝任虛損，又為風寒所乘，尺脈微小甚者，可灸關元穴。

鹿茸炙

赤石脂

禹餘糧各一兩

續斷

栝葉各二兩

附子炮一兩

熟地黃

當歸酒浸

艾葉各二兩

右為末，酒糊丸。梧子大，每五十丸，空心溫酒下。按此足少陰厥陰藥也。今人多用之，故收入。治血虛濕勝帶下甚捷。

元戎加味四物湯

氣充經脈，故月事類併。膈下多痛，本方加芍藥。經欲行，臍腹絞痛，本方加玄胡、檳榔、苦楝、木香。經水過多，本方加黃芩、白朮。經水澁少，本方加葵花、紅花。



經水適來適斷。或有往來寒熱。宜先服小柴胡去寒熱。後以四物湯和之。

丹溪加味四物湯

經候過而作疼。血氣俱虛也。宜本方對四君子湯服之。

經候將來作痛者。血實也。本方加桃仁。黃連。香附。經水不及期。血熱也。本方加黃連。

過期血少也。本方加參朮。帶痰。加半夏。陳皮。過期紫黑有塊者。血熱也。必作痛。本方加香附。黃連。

過期而淡色者。痰多也。芎歸二味合二陳湯服。

紫色成塊者。熱也。本方加黃連。柴胡。

肥人不及日數而多痰者。多血虛有熱。本方加香

附南星。半夏。黃連。白朮。

瘦人血枯經閉者。本方加桃仁。紅花。或越鞠丸。見方

血閉

簡易當歸散。治經候不勻。或三四月不行。或一月再至。或婦人天癸過期。經脈不調。

當歸

川芎

白芍藥

黃芩

白朮各半兩

山茱萸肉半兩

右為末。每二錢。空心溫酒調下。日三次。

按此足既陰少陰藥也。

寶鑑生地黄丸。治婦人血實。厥陰脉弦而長。病惡風。體倦。乍寒乍熱。面赤心忪。或時自汗如傷寒。狀宜服抑陰藥。

生地黄 二兩

柴胡

秦艽

黃芩 各半兩

芍藥 一兩

右末蜜丸。梧子大。每三十九丸。烏梅湯吞下。日三次。按此手足少陰大陰足少陽藥也。

謹按以上諸方。皆調理法也。然血分成水。氣腸單等證。詳見各門。茲不備錄。大抵經病實者。破之。結者散之。虛者補之。要在適事為故也。

○理氣之劑

澹寮煮附丸。治經候不調。血氣刺痛。腹腸膨脹。頭暈。惡心。崩漏帶下。並宜服之。

香附子

擦去皮不以多少。米醋盡一日。用瓦銚煮令醋盡。

右醋糊為丸。梧子大。日乾。每五十九丸。淡醋湯下之。一方香附一斤。艾葉四兩。當歸二兩。製同名艾附丸。

嚴氏抑氣散。治婦人氣盛於血。變生諸證。頭暈。犀發。

香附 四兩

茯神

甘草 各一兩

陳皮 二兩

右為末。每二錢。食前沸湯調下。

按此方主於氣。煮附丸則氣中之血藥也。然氣鬱甚者。宜於氣證門選用。不必拘此。

東垣益胃升陽湯。治婦人經候不調。或血脫後脉弱。

食少水泄日三二行

黃芪錢二

人參

甘草炙

當歸身

陳皮各一錢

白朮三錢

升麻

柴胡各十錢

炒麩二錢半

黃芩半錢秋去之

右哎咀每半兩水煎腹痛加芍藥

補中益氣湯治婦人室女經候不調脉微食少體倦

或熱方見熱門

按此二方氣血之藥血脫益氣之大法也

正氣天香湯治婦人一切氣氣上湊心心胃玫

脇肋疼痛月水不調

台烏藥二錢

香附子八錢

陳皮

蘇葉各一錢

乾姜半錢

右哎咀每七八錢水煎服

按婦人經病多有因於七情六鬱致者故集已

以其義大抵氣行不失其常則經血亦行

○通經之劑

良方通經丸治婦人室女經候不通臍腹疼痛或成

血瘕

川椒炒

蓬朮

乾漆炒

當歸一錢半

青皮

乾姜

大黃

桃仁炒

川烏

桂心各一錢



右爲末。將一半用米醋熬成膏。和餘藥成劑。日中  
杵之。丸如梧子大。陰乾。每三五十九。醋湯下。  
嚴氏方無川馬有紅花。

加味四物湯嚴氏名合湯治婦室經事不行。腹中結塊。疼  
痛腰痛。

本方加桂蓬米分等

右以咀每四錢水煎服

紅花當歸散。治婦人血臟虛竭。或積瘀血。經候不行。  
時作腹痛。腰膝重疼。小腹堅硬。及室女經不通。

紅花 當歸尾 紫葳 牛膝  
甘草 蘇木劉各三兩 白芷 桂心各一兩半

赤芍藥九兩 劉寄奴五兩

石爲細末。空心熱酒調三錢。一名凌霄花散。

桂枝桃仁湯。治經不通。繞臍寒。疝痛。其脉沉緊。此由  
寒客於血室。血凝不行。

桂枝 赤芍藥 生地黃各二兩  
桃仁五十箇 甘草一兩

右爲粗末。每服五錢。水煎入薑棗。

地黄通經丸。治經不行。結積成塊。臍下如覆杯。

熟地黄三兩 蜚虫去頭足炒 水蛭糯米炒  
桃仁各五箇

右爲細末。煉蜜丸。如梧子大。空心溫酒下。五九未。

知加至十九

嚴氏琥珀散。治婦人室女。月事凝滯。腹脇疼痛。及血逆攻心。眩暈不省人事。

劉寄奴 牡丹皮 熟地黄 玄胡索

烏藥 赤芍藥 莪朮 三棱

當歸 桂各一兩

右用前五味用烏豆一升。生姜半斤切。片炙香。四升同煮。豆爛為度。焙乾入。後五味同為細末。每服二錢。用溫酒調服。空心食前。戴人玉燭散治經候不通。腹脹或痛。四物湯對調。胃承氣湯。

右咬咀煎服

按以上諸方。並出厥陰例藥也。然有本於氣虛者。鬱血虛痰積等內。不同宜於前調經理氣諸方內選用。

○治崩漏之劑

生地黄散。治經漏下。血脈虛洪。經水紫黑。方見前

簡易黃芩湯。治崩中下血。陽乘陰。經水沸溢。

黃芩 不以多

右為末。每一二錢。燒利銚。滓酒調下。

按此二方治熱之劑也。

一法用此味。治天癸當任。每月却行。或過多。一

出瑞竹堂方名芩心丸

伏龍肝散。治氣血勞傷。衝任經虛。血非時崩下。臍腹冷痛。脉遲弱。食少。或赤白帶下。

伏龍肝

赤石脂

麥門冬

各一兩

甘草

炙半兩

川芎

當歸

乾姜

七錢半

桂

半兩

艾葉

熟地黄

右件為粗末。每四錢入棗煎。

按此治寒例藥。補血固虛之劑也。

備金散。治婦室血崩不止。

香附子

四兩炒

當歸尾

二兩

五靈脂

一兩炒

右為末。每五錢。淡醋湯調空心食前服。一方只用。

香附一味

茯苓補心湯。治婦人亡血過多。或氣逆心悶。

四物湯

一分

參蘇飲

三分

右咬咀入薑煎。

按以上方理氣補榮之劑也。

良方縮砂散治血崩。

新縮砂不以多少。瓦上炒香為細末。米飲調下。

三錢

五靈脂散治血山崩不止。

靈脂十兩水煎去滓澄清。再煎成膏。入神麩二

兩和九如梧子大。每三二十九。溫酒下。



荆芥散治崩中不止

用此一味於麻油燈上燒焦為末每三錢童便調下

端竹堂方蒲黃散治崩中不能止

破故紙 蒲黃 千古石灰各等分 炒過

右為末每二三錢淡酒或淡醋湯調下

按已上諸方皆劫劑也

東垣升陽除濕湯治婦人女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食失節或勞傷形體或素有心氣不足因飲食勞倦致令心火乘脾其脈緩而弦急按之洪大皆脾土受邪也

柴胡

羌活

蒼朮

黃芪

各一錢半

防風

甘草炙

升麻

藁本

各一錢

蔓荊子七分

獨活

當歸

各半錢

右咬咀作一服水煎食前服

涼血地黄湯治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守胞絡相火故血走而崩也

生地黄錢半

黃連

羌活

柴胡

防風各三分

黃柏

知母

升麻

藁本

細辛

川芎

各二分

甘草

一錢

荆芥穗

蔓荊子

黃芩

各一分

當歸

錢半

紅花許

右咬咀作一服水煎

按已上二方升劑也。經漏不止。氣血下陷。非此不能治。

當歸芍藥湯。治婦人經脈漏下不止。其色鮮紅。或先因勞役。脾胃虛損。氣短氣逆。自汗不止。身熱食懶。大便或泄。體倦無力。

黃芪半一錢

白朮

蒼朮

當歸身

白芍藥各一錢

熟地黃半錢

甘草炙

生地黃各一分

陳皮半錢

柴胡二分

右咬咀作一服水煎。按此補劑也。

○治帶下之劑

千金方。治帶下脈數者。

枸杞根兩一

生地黃兩五

右二味酒煮一升至三合作一服。

按此治熱例藥也。

元戎六合湯。治婦人赤白帶下。脈沉微。腹痛。或陰中痛。

四物湯兩四

桂

附子炮五錢

右咬咀。每五錢水煎。食前服。

按此治寒之劑也。

宣明導水丸。治濕熱鬱於下焦之分。赤白帶下不止。

躁熱煩渴方見濕門

按此治濕熱之藥下劑也

巖氏當歸煎丸治赤白帶下腹內疼痛不飲食羸瘦

當歸 赤芍藥炒 牡蠣煨 熟地黄

阿膠炒 白芍藥炒 續斷酒浸各一兩 地榆五錢

右為末醋糊丸梧子大每五十九空心米飲下

按此治血虛之劑潤燥藥也

良方白芷散治赤白帶下

白芷一兩 海螵蛸二箇 胎髮一團

右為細末空心溫酒調下二錢

伏龍肝散治婦人赤白帶下久患不瘥肌瘦黃瘁多

困乏力

棕櫚不以多少燒灰火 伏龍肝於鑪直下取炒令烟盡

屋梁上塵懸長者如無竈頭虛空中者炒令烟盡

右三味等分碾和令停入龍腦麝香各少許每服

二錢溫酒調下淡醋湯亦可患十年者半月可安

按已上方皆劫劑也

益母草散治赤白惡露下不止

益母草開花時採陰乾為細末空心溫酒調二

錢日三服

東垣回真丸治白帶久不止臍腹冷痛陰中亦然

白石脂一錢 乾姜炮四錢 黃柏酒製



白芍藥各一錢

白龍骨二錢

柴胡一錢

當歸身二錢

右除石脂龍骨別。研外。同為細末。水煮糊丸如桐子大。每十九。食前煎水下。

按此寒熱之劑。又止瀉藥也。

桂附湯。治白帶腥臭多。悲不樂。大寒。

肉桂一錢

附子二錢

黃柏

知母

甘草炙

升麻各半錢

黃芪一錢半

人參七分

右咬咀作一服。水煎。食前服。

按此補陽氣極虛。用黃柏等為引用。又升降陰陽之藥也。

補經固真湯。治白帶下流不止。胎病崩中。日久血少。

復亡其陽。故白滑之物不止也。

柴胡

甘草

郁李仁研

黃芩各一錢

乾姜二錢

橘皮半錢

人參二錢

白葵花去萼一朶

右咬咀水煎空心服。

按此補氣例藥也。

衛生湯。治帶下不止。脈微弱腹痛。

白芍藥炒

當歸各二兩

黃芪三兩

甘草一兩

右咬咀。或末。每五錢。水煎空心服。下苦楝丸三十

粒。

按此補血之劑也。

三參丸治赤白帶下

善棟酒浸

茴香炒

當歸各等分

右為末酒糊丸桐子大每五十九空心酒下

按此謂邪入小腸故用此燥丙藥也

白帶當歸丸治癩疔白帶下注脚氣腫已下如在水  
中。以火焙乾厚衣蓋其上猶氣冷不任寒之極  
者面白如枯魚之象。肌肉瘦削小便便不上與白帶  
帶流不禁病甚者

當歸一兩

茴香兩半

良姜

附子

炮各七錢

白四味改切以好酒一升半煮至乾再焙乾

黃益

全蠍各三錢

丁香

苦棟

二草各半錢

柴胡二錢

升麻

木香

各一錢

六胡索四錢

右藥前同為細末酒煮糊為丸如梧子大每五七

七色空心淡醋湯下忌酒濕麪油膩物

此丸升陽勝濕之劑氣血藥也

三參丸治白帶下陰戶痛控心急痛身黃皮燥

身黃如山陰中如水

防風

良姜

乾姜

郁李仁

甘草

各一錢

柴胡三錢

橘皮

海桐皮

各半錢

白葵花七

右改咀分作二服水煎空心服

按此升散之劑也

坐藥勝陰丹

三柰子

川烏頭

大椒各半錢

柴胡

羌活各二分

全蝎三筒

蒜七分

甘松二分

破故紙八分與蒜同煮

升麻

枯礬各二分

麝香許少

右為細末。煉蜜丸如彈子大。綿裹留系在外。納丸藥於陰戶內。

按此劫藥也

○灸法

氣海一穴在臍下一寸五分。主月事不調帶下崩中。

因產惡露不止。繞臍疔痛。灸五壯。

帶脉二穴。在季脇下一寸八分。啗者宛宛中。灸七壯。

主婦人月水不調。及閉不通。赤白帶下。氣轉運背。

引痛不可忍。

血海二穴。在膝膕上內廉白肉際二寸中。治女子漏。

下惡血。月事不調。逆氣腹脹。灸三壯。

陰谷二穴。在膝內輔骨後大筋下小筋上。按之應手。

屈膝取之。治婦人漏血不止。腹脹滿不得息。小便。

黃如蠱。膝如錐。不得屈伸。小腹引痛。灸三壯。

關元一穴。在臍下三寸。主婦人帶下。瘦聚。因產惡露。

不止。斷產下經冷。可灸百壯。



○安胎之劑

金匱方當歸散。妊娠宜常服之。

當歸 黃芩 白芍藥 川芎各一兩

白朮半兩

右五味為末。酒飲調服。方寸七日二次。

按此方養血清熱之劑也。瘦人血少有熱。胎動不安。數曾半產者。難產者。皆宜服之。以清其源而無後患也。

千金茯苓半夏湯。治妊娠惡阻。心悶吐逆。頭眩四肢怠惰。煩疼痰逆。嘔吐惡寒。自汗黃瘦。

半夏泡七次 生薑五兩 茯苓 熟地黃各三兩

橘紅 細辛 人參 白芍藥

紫蘇 川芎各二兩 苦梗 甘草各半兩

右以咀。每四錢水煎空心服。

局方參橘散。治妊娠三月惡阻吐逆不食。或心虛煩悶。

橘皮 茯苓各一錢 麥門冬

白朮 厚朴製 甘草各半兩

右以咀。每四錢入姜竹茹煎。一方加入參名竹茹湯。良方名人參橘皮湯。

良方膠艾湯。治妊娠或因頓仆胎動不安。腰腹疼痛。或胎上搶心。或去血腹痛。

阿膠一斤蛤粉炒

艾葉數莖

指迷方加秦艽

右二味以水五升煮取二升分三服

阿膠散嚴氏方作膠艾湯不問妊娠月數深淺或頓仆或因

毒藥胎動不安腰痛腹滿捨心短氣

熟地黄

艾葉

白芍藥

川芎

黃芪

阿膠

當歸

甘草炙各一兩

右咬咀每四錢入薑棗煎金匱方無黃芪

佛手散治妊娠傷胎下血

當歸三錢

川芎二錢

右咬咀水煎食前服

安胎散治妊娠自高墜下或為重物所壓觸動胎氣

腹痛下血胃虛嘔逆並宜服之

縮砂不以多少炒過

右為末每二錢用酒調服艾塩湯亦可

簡易方知母飲治妊娠心脾壅熱咽膈渴苦煩悶多

驚

赤茯苓

黃芩

黃芪各三兩

知母

麥門冬

甘草各二兩

右咬咀每四錢入桑白皮熟時入竹瀝些小服

竹葉湯治妊娠心驚膽怯終日煩悶名曰子煩

白茯苓四兩

防風

麥門冬

黃芩各三兩

右咬咀每四錢入竹葉五片水煎外臺方有竹瀝

二合無葉一方有黃芩知母

拔萃方枳殼湯治胎漏下血或因事下血

枳殼炒

黃芩各半

白朮一兩

右為末每一錢白湯調下宜明方無枳殼

二黃散治胎漏下血

生地黄

熟地黄

右為末煎白朮枳殼湯調下一錢或錢半

按良方論云婦人有子之後血畜以養胎矣豈可復能散動耶所以然者有娠而月信每至是亦未必因血盛也若謂榮經有風則經血喜動以其風勝則可此例可見胎漏之因非止一端也治者宜

擴充焉

地黄當歸湯治胎痛

當歸一兩

熟地黄二兩

右為末每半兩水煎良方等分為末蜜丸名內補丸許學士云大率婦人姓娠唯在抑陽助陰蓋此等藥甚多然胎前藥唯惡群隊若陰陽交錯別生他病唯是枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰故爾然枳殼散差寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽不至強陰不至弱陰陽調停有益胎嗣此前人未嘗論及也愚詳陰陽調停若不若不服為愈



全生方白朮散治妊娘面目虛浮肢體腫如木氣名

日子腫

白朮兩一

生薑片

大腹皮

陳皮

白茯苓皮各半兩

右為末每服二錢米飲調下指迷方有桑白皮無

白朮

李氏天仙藤散治妊娘自三月成胎之後兩足自脚

面漸腫腿膝以來行步艱辛以至喘悶飲食不美

狀似水氣至於脚指間有黃水出者名日子氣

天仙藤洗畧炒

香附子炒

陳皮

甘草

烏藥各等分

右為末每服三錢水煎入薑三片木瓜三片紫蘇

三葉同煎空心食前服日三次腫消止藥

按此二方治證例相類故併錄之

嚴氏紫蘇飲治胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛謂之

子懸

大腹皮

川芎

白芍藥

蘇葉

當歸各一兩

人參

甘草各半兩

右以咀每四錢入姜葱煎

安榮散治妊娘小便澀少遂成淋澀名日子淋

麥門冬

通草

滑石各三錢

當歸

澄心

甘草各半兩

人參

細辛各一兩

右為細末每二錢煎麥門冬湯調下

羚羊角散治妊娠中風頭項強直筋脉攣惡言語蹇

澁痰涎不利或時發搐不省人事名曰子癇

羚羊角錢一 川獨活 酸棗仁炒

五加皮錢各半 薏苡仁 防風

當歸 川芎 茯神

杏仁各四分 木香 甘草各二分

右咬咀每五錢入姜煎

八味丸治妊娠小便不通名曰轉胞亦治子淋方見補鹿

門

丹溪參朮飲治妊娠轉胞

四物湯加人參 白朮 半夏製

陳皮 甘草

右咬咀入生薑煎空心服

按丹溪曰轉胞之病胎婦之稟受弱者憂悶多者性急躁者食味厚者庸或有之古方皆用滑利藥鮮有應効因思胞不自轉為胎所壓展在一邊胞系了戾不通耳胎若舉起居於其中胞系自疏水道自利然胎之墜下必有其由近其宅墮人患此兩脉似瀉重則弦左稍和予曰此得之憂患瀉為血少氣多則胎氣弱而不能舉弦為有飲血少則胎弱氣多有飲中焦不清而隘則胞知所避而就

下乃以已上藥與非隨以指探喉中吐出藥汁候  
少頃氣定又與之。次早亦然至八點安。此法恐煩  
中耳後又治數人亦効。未知果何如耶。  
仲景云婦人本肌肥盛。頭舉目滿。今反羸瘦。頭舉  
中空。胞系了交。亦多致此病。但利小便則愈。宜服  
腎氣丸。以中黃散也。地黃為君。功在補胞。若  
頭舉等語。其說未詳。恐有能知之者。

按已上安胎諸法。皆氣血本病之藥。故非辛熱苦  
寒之劑。蓋產前當清熱養血也。然有外感風寒。內  
傷生冷。以辛熱散之。溫之。大積大聚。以藥衰其太  
平。而止經曰。婦人重身。毒之何如。岐伯曰。有故無

殞故無殞也。斯法亦不為本病之謂也。故難娘諸  
證例藥詳見大全良方。茲不備錄。

東胎丸於第八箇月服之

黃芩炒夏一兩春秋七錢半冬半兩 白朮二兩  
茯苓七錢半 陳皮三兩忌火

右為末。粥為丸。桐子大。每三四十九空。心白湯下。

蓮生散又名東

大腹皮三錢 人參 陳皮各一錢半

白朮 白芍藥各一錢 甘草炙二錢

紫蘇葉莖半錢 當歸尾一錢 或加枳殼縮砂

右咬咀。作一服。入青葱五葉。黃楊腦七箇。煎服。於

八九箇月服十數貼甚得力。或夏加黃芩春加芍  
冬依正方。或有別證以意消息

又方於第九箇月服

黃芩性弱人減半

白朮一兩

滑石

枳殼各七錢半

右為末粥丸如桐子大。每服三十九丸空心熱湯下  
按世俗婦室姪娘鮮有服東胎藥者。蓋局方良方  
諸法未能以盡其妙用者多。輒動娘。故率不敢行  
然丹溪先生因製已上諸方。以備世俗取擇實好  
生君子之一端也

○滑胎易產藥

枳殼散治姪娘胎肥。墮隘難產臨月服之

粉草

灸一兩

商州枳殼

二兩炒

右為細末。百沸湯點二錢。空心日三服

一方枳殼六兩甘草一兩

一方有糯米半升淘控乾同炒為末

溫隱居加當歸木香各等分

又法張氏方治姪娘胎肥動止艱辛臨月服之縮胎

易產治氣寬膈

枳殼五兩

甘草一兩半

香附子二兩炒

右為細末姜湯點服

神寢丸滑胎易產入月服之

通明乳香半兩

枳殼一兩



右為末。煉蜜丸。梧子大。空心酒下三十九。

陸氏名寤生丸。乳香只一分。

保氣散。安胎易產。或居處失宜。偶然頓仆。胎動胎痛。漏胎下血。兼服佛手散。

香附子兩四

山藥兩二

縮砂兩一

木香錢四

粉草兩一

益智仁

紫蘇各半兩

右為細末。白湯點二錢。八月服之。

三元散。八月服之。滑胎易產。方見前

○產間藥

范氏催生如意散。臨產腰疼。方可服之。

人參

乳香各一錢末

辰砂半錢

右三味一處研。臨產急用。雞清一箇調藥末。再用生姜汁調。冷服。如橫生倒產。即時端順而生。

催生佛手散。方見前

嚴氏無憂散。治胎肥氣逆。或入瘦血少胎弱。臨產難

產者。便產須知名保生無憂散。

當歸

川芎

白芍藥各一兩

枳殼炒五錢

乳香三錢

木香一錢半

血餘灰二錢

甘草一錢

右為末。每二錢水煎服。

簡易集效黑散子。催生兼治橫生逆產。

百草霜

白芷末各等分

右和勻。每二錢。童便并好醋調。稀更以沸湯調下。

局方催生丹治產婦生理不順產育艱難或橫或逆並宜治之

十二月兔腦髓去皮膜研如泥

乳香別研細五分

母丁香二錢半

麝香另研五分半

右三味拌勻以兔腦和丸如雞頭大陰乾油紙裹每一丸溫水下即產兒手中握出

良方催生乳香膏名如神開骨膏又名乳珠丹

一法滴乳為末用猪心血為丸五月五日午時合

右如桐子大硃砂為衣每一粒面東酒吞下未下再服如胎乾者先與四物湯

秘方益母丸專治橫生逆產難產并安胎順氣神効益母草五月採陰乾石臼搗為末煉蜜丸如彈子大每一丸或二丸臨產以童便和溫酒送下氣不順木香參湯送下或作小丸吞服亦可

獨勝散

黃蘗子炒七十粒

研爛酒服濟窘急

若也臨危難產時

免得全家俱哭泣

小品療橫生倒產手足先出方

用粗針刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮自當回順而生

一法益塗兒足底又可急搔爪之并以搥摩產

婦腹上即產

機要半夏湯治胎衣不下。或子死腹中。或子衝上。而昏悶。或血暴下。及胎乾不能產者。

半夏麩一兩半

桂七錢半

桃仁三十箇炒

大黃兩半

右為細末。先服四物湯三兩次。服此。生姜同煎。

良方治死胎不下。其證產母舌青黑。及胎上冷。若子已死。或指甲青。舌青。脹悶甚者。口中作屎臭。先以平胃散一貼作兩服。每服酒水各一盞。同煎至一盞。却投朴硝半兩。研細。再煎數沸。溫服。胎化血水而下。

鹿角散治因熱病胎死腹中

鹿角屑一兩

右水煎入葱白五莖。豉半合。丹溪云。燒過治產後血暈。

當歸湯治子死不下

川當歸三兩

川芎二兩

右為末。水酒各半調下。四錢末下再服。一方只用川芎末酒煎服。

香桂散下死胎

麝香半錢

桂心三錢為末

右和勻。只作一服。溫酒調下。

一方朴硝末二錢温童便調下

必效方牛膝湯治胎衣不出腹脹堅脹急痛即殺人服此胞即爛下死胎

牛膝

瞿麥各四兩

當歸三兩

通草六兩

滑石八兩

葵子五兩

右切細以水九升煮取三升分三服

宜明礞散治胎死腹中不下

礞石研細

當歸各一兩

右二味研極細只分作二服温酒調下如重車行五里不下再服

局方至寶丹方見中風門

花藥石散治胎死腹中及胎衣不下

花藥石斤一

上色硫黃四兩

右二味相拌勻煉製見損傷門

黑龍丹治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡疾垂死者但灌得下無不全活

當歸

五靈脂

川芎

良薑

熟地黄

各一兩剉以砂合盛赤石脂泥封紙筋塩泥固濟炭火十斤煨令通赤去火候冷取開看成黑糟色取細研却入後藥

百草霜五兩

硫黃

乳香各一錢半



花藥石

琥珀各一

右五味並細研與前藥再研如法修製和勻以米醋煮用麵糊丸如彈子大每服一九炭火燒令通赤投於生姜自然汁與童便入酒漉出控乾研細只此酒下

一方取死胎用烏雞一隻去毛細切水煎三二升湯通手用衣帛蘸摩臍下胎自出

○產後雜方

局方芎歸湯治產後去血過多暈煩不省

當歸

芎藭各等分

右咬咀每半兩水煎服腹疼加桂各桂香散一名

琥珀散治腹中痛急自汗頭眩少氣加羊肉名羊肉湯

黑神散治產後惡露不盡胎衣不下血氣攻心及腹

痛不止

黑豆炒半升

熟地黄

當歸

肉桂

乾姜

甘草

白芍藥

蒲黃各四兩

生地黄

局方良方俱無此味便產須知有之

右為末每二錢酒童便各半調服一名烏金散

按此手少陰足厥陰太陰陽明表裏血藥也立方大意見前丹溪之論矣今人以為治產後百病率用之故收入然用者自宜通變

人參當歸散治產後去血過多血虛則陰虛陰虛則內熱心煩短氣自汗頭痛

熟地黄

人參

當歸

桂

麥門冬

白芍藥

右以咀每五錢入竹葉生薑煎

當歸黃芪湯治產後失血多腰疼身熱自汗

當歸

黃芪

白芍藥

右以咀每五錢入姜煎

失笑散治產後心腹絞痛欲死及見枕痛

蒲黃

五靈脂

右為末醋調二錢熬成膏湯化服之

一法治兒枕痛各單服

經驗方三聖散治兒枕痛

當歸

桂心

玄胡索

右等分為細末每服二錢熱酒或童便調下

嚴氏清魂散治產後血暈昏不知人更宜取漆器於

床前燒薰之頻置醋炭更服此藥

澤蘭葉

人參

荆芥穗

甘草

川芎

右為末每二錢熱湯溫酒各半盞調下

抵聖湯治產後血氣傷於脾胃腹脇滿悶嘔逆惡心

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

一 陳皮 人參各二錢 甘草灸一錢

右咬咀作一服。入生姜煎。

當歸羊肉湯。治產後發熱自汗肢體疼痛。名曰虛勞。

當歸 人參各七錢 黃芪兩 生薑兩半

右咬咀。用羊肉一斤。煮清汁五大盞。去肉入煎藥。

煎四盞。去粗作六服。

良方茯苓散。治產後心虛怔忡不定。言語錯亂。

人參 甘草 山藥 當歸各一錢

生薑 遠志 茯苓 桂心

麥門冬各半錢 大棗五枚

右咬咀水煎。

機要增損柴胡湯。治產後經水適斷。感於異證。手足

捧搖。咬牙昏冒。

柴胡八錢 黃芩四錢 人參三錢

甘草炒 石膏各四錢 知母三錢

黃芪五錢 半夏三錢

右為粗末。每半兩入姜棗煎。

血風湯。治產諸風痿痺無力。

秦艽 羌活 防風 白芷

川芎 白芍藥 白朮 當歸

地黃 茯苓 半夏 黃芪各等分

右為末。一半為丸。煉蜜桐子大。一半為散。溫酒送。

下五七十九

愈風散治產後中風口噤牙關緊急手足痲痺如角弓狀

荆芥穗各炒

右每三錢豆淋酒調下童便亦可一方加當歸

謹按產後多有血病身強痲痺而似中風者宜用此藥通血脈而清神或加當歸者為然非外因例藥也是以姑錄此一法我見後丹溪論

獨行散治產後血暈昏迷

五靈脂炒

右為末水調童便調下一二錢

當歸散治產後氣血俱虛無大補恐增客熱宜服此去惡露

當歸

三為藥

川芎

黃芩各一兩

白朮兩

右為細末溫童便調下二錢

黃芪湯治產後汗不止因陰虛而得

黃芪二錢

白朮

防風

熟地黃

牡蠣殼

白茯苓

麥門冬

甘草炙各半錢

右咬咀每半兩入棗煎

加減四物湯治產後陰虛發熱或日間明了暮則發



熱增寒

當歸

川芎

生地黃

柴胡

右等分。每四五錢水煎

瑞竹堂方。治產後血塊腹痛

京芎炒

當歸炒

熟地黃

白芍藥炒各半兩

蒲黃炒二錢半

右同為細末。每服三錢。空心溫酒調下

丹溪參朮膏。治產後胞損成淋瀝證

人參二錢半

白朮二錢

桃仁

陳皮各一錢

黃芪一錢半

茯苓一錢

甘草炙半錢

右咬咀水煎猪羊胞。後入藥作一服

丹溪曰。嘗見尿胞因收生者不謹。以致破損。而得淋瀝證。有徐氏婦。於壯年得此。因思肌肉破傷在外者。且可補完。胞雖在腹。恐亦可治。診其脉虛甚。因悟曰。難產之人。多是氣虛。難產之後。血氣尤虛。因用峻補。以參朮膏煎。以猪羊胞。極飢時與之。每劑用一兩。至一月而安。恐是氣血驟長。其胞可完。若稍遲緩。恐難成功。

盛氏越痛散。治產後血滯。筋脉拘攣。腰背強直。遍身

疼痛

田歸

桂

白朮

牛膝

甘草各三錢

黃芪

獨活

生姜各半兩

白  
右改咀。每半兩水煎。

按此手足三陰藥。出太陽例。治表之劑也。然惡露不盡。絞痛不止。宜良方芎歸湯散。治裏之劑。以大黃桃仁等藥下之。血畜經絡成血塊。宜沒藥丸以蠶虫水蛭等藥逐之。皆變法也。茲不詳錄。故已上諸方。皆調理之劑。餘有異證。詳見大全良方。謹按產後血滯於經。多成癰腫。或有致不救者。蓋氣血虛損。逆之甚也。大抵此兼陰虛火動。凡辛溫之劑。宜慎之。矧產後用藥有三禁。我丹溪先生謂產後如無惡阻。當大補氣血。雖有雜證。以末治之。

如中風。切不可作風治。與小續命湯。必先補氣血。然後治痰。當以左右手之脉。分其氣血多少而治。如發熱惡寒。皆是氣血。左手脉不足。用補血藥。多於補氣藥。右手脉不足。用補氣藥。多於補血藥。惡寒發熱腹痛者。當去惡血。以求通變之意也。